

EC FERTILIZER
KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ
AllinCa'L 145

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	15,0
KLOR İÇERİĞİ: %20,5	

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 +90 242 344 04 89
makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER :

AllinCa'L 145: Suda tamamen (%100) ve hızlı dağılan ve %15,0 Kalsiyum Oksit içeren Sıvı Kalsiyum çözeltisidir. Bitkilerde bu elementin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile Kalsiyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur. Çocuklardan, yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalıdır. Gözleri tahriş edebilir. Deriye temas ettirmeyiniz. Teması durumunda bol su ve sabun ile yıkanması gerekmektedir. Serin ve kuru bir yerde iyi muhafazalı bir şekilde saklanmalıdır.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI :

AllinCa'L 145: Tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir. Gerekli görüldüğü şekilde yapraktan püskürtülerek ya da damla sulama sisteminden uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce ürünü iyice çalkalayınız, etiketi okuyunuz.

KARIŞILIRLIK:

Bu ürün aşırı alkali ve asidik reaksiyonlu, yağ bazlı yüksek sülfür ve bakır içeren ürünler hariç diğer bir çok zirai ilaç ve gübre ile karıştırılarak kullanılabilir de geniş alan uygulamalarında ve tereddüt halinde mutlaka ön test yapılması tavsiye edilir.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında ziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: (+5°C ile 40 °C).

UYARILAR

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Deri ve göz temasından kaçınılmalı, teması durumunda bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ürünü serin ve kuru bir yerde iyi muhafaza edilmiş bir şekilde saklayınız. Direk güneş ışığı altında tutmayınız. Ürünün teneffüsü durumunda beklenmedik bir etki görülür ise doktora başvurunuz. El ile taşırken dik tutunuz, sallamayınız. Yiyecek, içecek ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Antalya Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No:15 P.K:07190 Döşemealtı / ANTALYA
Tel:0242 344 83 88 - 344 07 83 Faks:0242 344 04 89

Antalya Kurumlar V.D. 611 007 05 84

Firma Temsilcisi

FİRMA BEYANI :

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması durumunda, hatalı depolama ve kullanımından doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

BİTKİLER	UYGULAMA ÖNERİLERİ	DOZ / 100 L SUYA YAPRAKTAN
SEBZELER Domates, Hıyar, Patlıcan, Biber vs.	Vejetatif gelişim döneminde Meyve bağlama ve meyve büyüme başlangıcında	75-100 cc 150-200 cc
ÇİLEK	Meyve oluşumunu takiben her 15-20 günde bir uygulama	100-125 cc
BAĞ	Aktif gelişme döneminde Meyve bağlama ve meyve büyüme başlangıcında Hasada yakın	100 cc 150 - 200 cc 200 cc
ELMA	Çiçek taç yapraklarının dökümünden hemen sonra başlanarak 15 gün aralar ile hasada kadar 4-6 uygulama	100 cc
ŞEFTALİ-KİRAZ-ERİK-KAYISI vs.	Meyve oluşumunu takiben veya hasattan önce tek uygulama	100 cc
KAVUN-KARPUZ	Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaşınca 1. uygulama, birinci uygulamadan 10-15 gün sonra 2. uygulama	125 - 150 cc 150 - 200 cc
TARLA BİTKİLERİ	Bitki gelişim döneminde ihtiyaca göre 2-4 uygulama	150 - 200 cc
SOĞAN	Baş bağlama döneminde ve hasada yakın dönemde 1-3 uygulama	100-150 cc
FINDIK	Meyve bağlama ve iç doldurma döneminden hasada kadar 2-4 uygulama	125-200 cc
KARNABAHAAR-BROKOLİ- LAHANA vs.	Baş bağlama dönemi başlangıcından hasada kadar 1-3 uygulama	100 cc
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Bitki gelişim döneminde ve ihtiyaca göre 1-3 uygulama	50-100 cc

Yoğunluk (d) 1,38 g/ml

Net ağırlık: 0,345– 0,690 – 1,38 – 6,90 – 13,8 – 20,7 – 27,6 –34,5 - 50 kg

Net hacim: 0,250- 0,500 – 1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25– 36,23 LT

Bakanlık Lisans No: 047

Bakanlık Tescil No: 25187


Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No:

Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



makro tarım
İNŞ. TAAH. TİC. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Antalya Bulvarı No:15 / 07100 Döşemealtı
Tel: 0242 344 83 88 - 344 07 83 Faks: 0242 344 84 89 ANTALYA
Antalya Kurumları / D. 611 807 05 84

Firma Temsilcisi