

EC FERTILIZER

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

CALİDOOR

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	15,0
Suda Çözünür Bor (B)	0,2

KLOR İÇERİĞİ: % 19,8

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 + 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER :

CALİDOOR: Suda tamamen (%100) ve hızlı dağılan ve %15,0 Kalsiyum Oksit ve % 0,2 Bor içeren sıvı Kalsiyum Çözeltisidir. Bitkilerde bu elementin yetersiz olduğu veya toprak, hava, kuraklık, soğuk, stres vb. nedenlerden dolayı bitkilerin Kalsiyum'u alamadığı durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile Kalsiyum eksikliği giderilmesine yardımcı olur.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI :

CALİDOOR Tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir. Gerekli görüldüğü şekilde yapraktan püskürtülerek ya da damla sulama sisteminden uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce ürünü iyice çalkalayınız, etiketi okuyunuz.

KARIŞABİLİRLİK:

Bu ürün aşırı alkali ve asidik reaksiyonlu, yağ bazlı yüksek sülfür ve bakır içeren ürünler hariç diğer bir çok zirai ilaç ve gübre ile karıştırılarak kullanılabilir de geniş alan uygulamalarında ve tereddüt halinde mutlaka ön test yapılması tavsiye edilir.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI :

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: (0 °C ile [+40]°C). Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı bir ürün değildir.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

- * Yaprak uygulamaları sırasında zerrelere teneffüs etmeyiniz.
- * Yaprak uygulaması sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz, hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz.
- * Maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
- * Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- * Günün en yüksek sıcaklıktaki saatinde uygulamadan kaçınınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

UYARILAR

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz temasından kaçınılmalı, teması durumunda bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ürünü serin ve kuru bir yerde iyi muhafaza edilmiş bir şekilde saklayınız. Direk güneş ışığı altında tutmayınız. Ürünün teneffüsü durumunda beklenmedik bir etki görülür ise doktora başvurunuz. El ile taşıırken dik tutunuz, sallamayınız. Yiyecek, içecek ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.



makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 344 83 88 - 344 07 83 Fax: 0242 344 04 89
Antalya Kurumlar D. 611 007 85 84

FİRMA BEYANI :

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması durumunda, hatalı depolama ve kullanımından doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

BİTKİLER	UYGULAMA ÖNERİLERİ	DOZ	
		Yapraktan 100 lt. suya veya da	Topraktan lt/da
SEBZELER (Domates -Hıyar-Patlıcan -Biber – Bezelye vs.)	Meyveli dönem başlangıcından, hasat sonuna kadar	200 - 250	3 - 4
MEYVE AĞAÇLARI	2- 6 uygulama. Meyve bağlama, büyümesi ve hasat öncesine kadar	200 – 300	3 - 4
BAĞ	3 – 4 uygulama Meyve bağlama, büyümesi ve hasat öncesine kadar	250 - 300	3 - 4
NARENCİYE	3 – 4 uygulama Meyve tutumu, büyümesi ve hasat öncesine kadar	250 – 300	3 - 4
PAMUK	3 – 4 uygulama Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2 – 3 uygulama	200 - 300	1 - 3
Hububat, Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama	200 - 300	1 - 3
ŞEKER PANCARI , HAVUÇ	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 - 3 uygulama	200 – 300	2 - 3
PATATES	Bitki 20 – 25 cm boya erişince 15 gün ara ile 1 – 2 uygulama	200 – 300	2 - 3
KAVUN, KARPUZ	Kol atımından sonra 15 gün ara ile hasat boyu 3 – 4 uygulama	200 - 300	2 – 3
AYÇİÇEĞİ	Bitki 20 – 25 cm boya erişince 15 gün ara ile 1 – 2 uygulama	250 – 350	1 – 3
FINDIK	Çiçek öncesi, bıyık bağlama ve iç bağlama döneminde 3 uygulama	250 - 350	2 - 3
ÇİLEK , AHUDUDU	Çiçek öncesi, sonrası 15 gün ara ile 3 – 4 uygulama	200 – 250	1 - 3
MUZ	Oluşum öncesi ve sonrası	250 – 350	2 - 3
MISIR	Bitki 30 – 40 cm olunca ve tepe püskülü çıkarıldığında 1 – 2 uygulama	200 – 250	1 - 3
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yapraklanma dönemi ve sonrası 2 uygulama	200 – 250	1 – 3
SOĞAN	Dikimden 30 gün sonra tek uygulama	200 – 250	2 - 3

Yoğunluk (d): 1,34 g/ml

Net ağırlık: 0,335– 0,670 – 1,34 – 6,70 – 13,4 – 20,1 – 26,8 – 33,50-50 kg

Net hacim: 0,250- 0,500 – 1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 37,32 lt

Bakanlık Lisans No:047

Bakanlık Tescil No:25078

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

makro tarım
İNS. TAAH. TUP. PAZ. SAN.ve TIC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Kurumları Yolu No:15 07100 Döğemealtı
Tel:0242 344 83 88 - 334 07 83 Fax:0242 344 04 89
Antalya Kurumlar Y.D. 611 007 05 84