

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

FosCal-BK 3,5 - 6 - 10,5 +(14,5 CaO) + ME

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>%</u>
Toplam Azot(N)	: 3,50
Nitrat Azotu (N)	: 3,50
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	: 6,00
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P ₂ O ₅)	: 6,00
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	: 10,50
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO)	: 14,50
Suda Çözünür Bor(B)	: 0,40

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !

SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA



+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88



+ 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER:

FosCal-BK; %3,5 Azot(N), %6,0 Fosfor(P₂O₅), %10,50 Potasyum(K₂O), %14,5 Kalsiyum(CaO) ve %0,4 Bor(B) içeren süspanse(jel) NPK+Ca +ME Gübresidir. Tarımsal üretimde bu elementlerin yetersizliğinden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesinde olumlu katkı sağlar. Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Etiketdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

FosCal-BK ; Hem yapraktan hem topraktan (damla sulama-salma sulama, spring ile sulama ve yağmurlama sulama) Uygulamalardır.

Rüzgarlı, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız.

Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini dikkatlice okuyunuz.

Önerilen uygulama dozları aşmayınız. Uygulama esnasında koruyucu eldiven, elbise ve maske kullanınız. Hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı : +5 ila +35 derece arasında olmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız.

FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği, toprak yapısı vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.



makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 / 07190 Döşemealtı
Tel:0242 344 83 88 - 0242 344 83 88 Fax:0242 344 04 89 ANTALYA

Antalya Temsilcisi
Haydar Ali KARAKOÇ
Firma Temsilcisi

UYARILAR:

- Çocuklardan, Gıdalardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, Ürünü ve Zerreleri Koklamayınız, teneffüs etmeyiniz.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, Asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- Uygulamalar sabah erken ve akşam üzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli, don riski olan günlerde ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Uygulamadan önce Ürünü karıştırınız(çalkalayınız) ve etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür ve çökmez.
- Toprak ve Yaprak Analizi yapılarak Gübre Kullanılması Tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK:

- Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilirse de, İçeriği bilinmeyen ürünler, Kükürt içeren ürünler, Yüksek asidik ve Bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında ve tereddüt halinde danışmanınızdan destek alınız veya mutlaka ön test yapılmalıdır.

ÖNERİLEN BİTKİLER VE ÖNERİ DOZLARI

A-TOPRAKTAN UYGULAMA:

SEBZELER Örtü Altı Bitkileri ve Açık Alan Sebzeçilik(Domates,Biber,Patlıcan,Hıyar,Kabak,Kavun-Karpuz vs)

Damlamadan(topraktan):0.8-1.2 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

MEYVELERDE; KİRAZ-VİŞNE-NEKTARİN-ŞEFTALİ-KAYISI-ELMA-ARMUT-ERİK v.s

Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 15-25 gün önce.

MUZ; Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

ZEYTİN-FINDIK-ANTEPFISTIĞI-BAĞ-NAR; Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

NARENCİYE; Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

ÇİLEK; Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

PAMUK; Damlamadan veya Salma Sulama(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

PATATES; Damlamadan veya Salma Sulama(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

KESME ÇİÇEKÇİLİK: Bitki gelişim aşamasında, ihtiyacına göre Topraktan 0.7-1.0 Kg/da.

YOĞUNLUK: 1,44 g/ml

NET AĞIRLIK: 0,36-0,72-1-1,44-5-7,2-7,5-10-14,4-15-18-20-21,6-25-28,8-36-43,2-48,96 kg

NET HACİM: 0,25-0,5-0,7-1-3,48-5-5,21-6,95-10-10,42-12,5-13,89-15-17,37-20-25-30-34 lt

Lisans No: 047

Tescil No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No:

Barkot:

X

Tahrir Edicidir

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.



makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel:0242 344 83 88 - 33 07 83 Fax:0242 344 04 89
Antalya Kurumlar D. 011 007 05 84

Haydar Ali KALAKOÇ
Firma Temsilcisi