

EC FERTILIZER

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

KelomMixCOMBİ

Garanti Edilen İçerik :	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.5
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	% 1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 2,4
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	% 1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	% 1

EDTA Şelatının stabil olduğu pH Aralığı: Bakır, Demir, Mangan ve Çinko : 3 – 9

Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanılacaktır.

Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız.

TEKNİK BİLGİLER: KelomMixCOMBİ; % 0.5 Bor (B), %1, Bakır (Cu), %5 Demir (Fe), % 2,4 Mangan, % 0,1 Molibden ve % 4 Çinko (Zn) içeren katı mikro bitki besin maddeleri karışımıdır.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI: KelomMixCOMBİ tüm püskürtme sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğünde bu uygulama hem topraktan hem de yapraktan yapılabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı ve sıcak havalarda yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.

FİRMA BEYANI: Etiketle verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup; her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs) Şirketimiz bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketleki bilgilerin uygulanmaması halinde hatalı depolama ve kullanımdan doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI: normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (5 °C ile 45 °C) 'dir. Nem ile temas ettirilmemelidir, ambalaj açık bırakılmamalı, açık kalması halinde keklenme olabilir. Bu durumun ürünün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

NOT ve TAVSİYLER: KelomMixCOMBİ; Mikro granül yapıda suda çözünebilir katı mikro bitki besin maddeleri karışımıdır. Mikro besin elementlerinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama ile bitkide bulunan bu elementlerin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur. Yapılan test ve araştırmalarda herhangi bir fitotoksiteye rastlanmamıştır. Geniş alan uygulamalarında ve son karışım hazırlanmadan önce ön test yapmak yerinde olur. Şüphede halinde **MAKRO TARIM** teknik departmanı ile temasa geçilmesi tavsiye edilir.



makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Antalya Örg. San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Durmuş DEMİRE
Şirket Vekili

UYARILAR:

- *Tavsiye edilen dozlarda suda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz. Zirai mücadele ilaçları ve yaprak gübreləri ile karışabilir. Tereddüt halinde ön test yapınız.
- *Uygulamalar sabah erken, akşamüzeri ve çiğ yok iken yapılmalıdır.
- *Çocuklardan, gıda ve evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır.
- *Göz ve deriye teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Yutmayınız ve teneffüs etmeyiniz.
- *Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Ürün nem ile temas ettirilmemelidir, acıktıktan sonra kullanılmalıdır.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak): Yapraktan uygulamalarda 40-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 200-400 gr/da

Çilek: Yapraktan uygulamalarda 40-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 300-500 gr/da

Meyve Ağaçları (Şeftali, Armut, Kayısı, Erik vs): Yapraktan uygulamalarda 40-75 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 20-50 gr/ağaç.

Muz: Yapraktan uygulamalarda 50-70 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 20-40 gr/ağaç.

Zeytin: Yapraktan uygulamalarda 40-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 30-60 gr/ağaç.

Bağ: Yapraktan uygulamalarda 70-90 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 300 - 500 gr/da

Narenciye: Yapraktan uygulamalarda 40-80 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 20-50 gr/ağaç.

Şekerpancarı: Yapraktan uygulamalarda 50-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 300-500 gr/da

Pamuk, Mısır, Ayçiçeği: Yapraktan uygulamalarda 60-80 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 250-350 gr/da

Patates: Yapraktan uygulamalarda 60-80 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 300-500 gr/da.

Fındık: Yapraktan uygulamalarda 50-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 30-40 gr/ağaç.

Kesme çiçekçilik: Yapraktan uygulamalarda 40-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 200-300 gr/da.

Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vs): Yapraktan uygulamalarda 60-80 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 250-350 gr/da.

Kavun, Karpuz: Yapraktan uygulamalarda 40-60 gr/da. Toprakta Uygulamalarda 200-300 gr/da.

Net Ağırlık: :



T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / BUGEM

Lisans NO: 047 Tescil NO: 18084 Parti NO Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi:

İmalatçı

Makro Tarım İnşaat Taahhüt Turizm Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım, Antalya Bulvarı No:15 07190
Döşemealtı/ANTALYA Tel 0242 344 8388 Fax 0242 344 0489

E-Mail : makrotarim@makrotarim.com.tr Web: www.makrotarim.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi beşinen kabul ederiz

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
Antalya Org.San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili