

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

NitFosCal-B 3.5-6-10.5 + (14.5 CaO) + ME

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>%</u>
Toplam Azot(N)	: 3,50
Nitrat Azotu (N)	: 3,50
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	: 6,00
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P ₂ O ₅)	: 6,00
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	: 10,50
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO)	: 14,50
Suda Çözünür Bor(B)	: 0,40

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 +90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER:

NitFosCal-B; %3,5 Azot(N), %6,0 Fosfor(P₂O₅), %10,50 Potasyum(K₂O), %14,5 Kalsiyum(CaO) ve %0,4 Bor(B) içeren süspans(jel) NPK+Ca +TE Gübresidir. Tarımsal üretimde bitkilerde görülen ve/veya görülebilecek bu elementlerin eksikliklerin giderilmesinde kullanılır ve önerilir. Ayrıca köklenme üzerine ve meyvelerin daha canlı ve parlak olmalarına olumlu katkı verir. Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Etiketdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini dikkatlice okuyunuz.

Önerilen uygulama dozları aşmayınız. Uygulama esnasında koruyucu eldiven, elbise ve maske kullanınız. Hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı : +5 ila +35 derece arasında olmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız.

FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği, toprak yapısı vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

 **makro tarım**
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel: 0242 344 83 88 - 334 07 83 Fax: 0242 344 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumları V.D. 817 007 05 84

Firma Temsilcisi

UYARILAR:

- Çocuklardan, Gıdalardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, Ürünü ve Zerreleri Koklamayınız, teneffüs etmeyiniz.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, Asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- Uygulamalar sabah erken ve akşam üzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli, don riski olan günlerde ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Uygulamadan önce Ürünü karıştırınız(çalkalayınız) ve etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür ve çökmez.
- **Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**
- **DİKKAT TAHRİŞ EDİCİDİR.**

KARIŞABİLİRLİK:

- Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilirse de, İçeriği bilinmeyen ürünler, Kükürt içeren ürünler, Yüksek asidik ve Bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında ve tereddüt halinde danışmanınızdan destek alınız veya mutlaka ön test yapılmalıdır.

ÖNERİLEN BİTKİLER VE ÖNERİ DOZLARI**A-TOPRAKTAN UYGULAMA:****SEBZELER Örtü Altı Bitkileri ve Açık Alan Sebzeçilik(Domates,Biber,Patlıcan,Hıyar,Kabak,Kavun-Karpuz vs)**

Damlamadan(topraktan):0.8-1.2 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.

MEYVELERDE; KİRAZ-VİŞNE-NEKTARİN-ŞEFTALİ-KAYISI-ELMA-ARMUT-ERİK v.s

Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 15-25 gün önce.

MUZ; Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.**ZEYTİN-FINDIK-ANTEPFISTIĞI-BAĞ-NAR;** Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.**NARENCİYE;** Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.**ÇİLEK;** Damlamadan(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.**PAMUK;** Damlamadan veya Salma Sulama(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.**PATATES;** Damlamadan veya Salma Sulama(topraktan):0.8-1.0 Kg/da.Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce.**KESME ÇİÇEKÇİLİK:** Bitki gelişim aşamasında, ihtiyacına göre Topraktan 0.7-1.0 Kg/da.**YOĞUNLUK: 1,44 g/ml****NET AĞIRLIK: 0,36-0,72-1,44-7,2-14,4-21,6-28,8-36-43,2-48,96 kg****NET HACİM: 0,25-0,5-1-5-10-15-20-25-30-34 lt****X****Tahrış Edicidir****Lisans No: 047****Tescil No: 30441****Üretim Tarihi:****Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır****Parti/Şarj No: Barkot:**

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

