

EC FERTILIZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
P.Zinc

3-25-0+TE

Garanti Edilen İçerik : (%)	w/w
Toplam Azot (N)	: 3.0
Üre	: 3.0
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5)	: 25.0
Suda çözünür Çinko (Zn)	: 5.0



21-06-2017

Teknik Bilgiler

P.Zinc; Suda tamamen(%100) çözünen Azot(N), Fosfor(P2O5) ve Çinko(Zn) içeren NP gübre çözeltisidir. Bitkilerde bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile, bu elementlerin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Ürünün Doğru ve Verimli Kullanımı

P.Zinc; sulama sistemlerinden (salma-damlama-spring-dökme vs.) topraktan uygulanabileceği gibi gerek görüldüğünde yapraktan püskürtülerek de uygulama yapılabilir. Rüzgarlı, çiğli, don riski olan günlerde ve sıcak havalarda yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini okuyunuz. Önerilen Dozları aşmayınız.

Uygun Depolama Koşulları

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasa özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı : +5 ila +40 derece arasında olmalıdır. Ürünü nemle temastan ve direkt güneşten koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız.

Firma Beyanı

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

Uyarılar

Çocuklardan, Gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.

Yutmayınız ve zerrelere tenneffüs etmeyiniz.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.

Uygulamalar sabah erken ve akşamüzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli sıcak ve don riski olan günlerde yapraktan uygulama yapmayınız. Don riski olan günlerde topraktan uygulama önerilmez.

Boş ambalajları usuline uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.

Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.

Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz

Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilir. (Bakırlı, Kükürtlü, Yağ içeren veya içeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik ve Bazik ürünler ile **KARIŞTIRILMAMALI**, geniş alan uygulamalarında öntest yapılmalıdır.) Tereddüt halinde Teknik ekibimizle temasa geçiniz.

Not: Cild ve göze teması durumunda tahriş edici olabilir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu elbise kullanılmalıdır.

Toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Antalya Org.San Böl 1 Kısım Antalya Bulv No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTAI YA
Antalya Kurumları B. 011 007 0584

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

Tavsiye Edildiği Bitkiler

Örtü altı bitkileri (Domates,Hıyar,Patlıcan,Kabak v.s.), Açık tarla sebzeciliği, Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları, Pamuk, Hububat, Şeker pancarı, Çilek, Ayçiçeği, Bağ, Mısır, Patates, Soğan, Narenciye, Zeytin, Süs bitkileri, Kesme Çiçek, Havuç, Muz, Kışlık ve Yazlık Sebzeler

Kullanımı-Dozu ve Zamanı

Örtü altı bitkileri (sebzeler) : 100 L suya 150-200 cc (150 cc/da).

Açık tarla sebzeleri : 150-250 cc/da (Çiçeklenme döneminin başlangıcında)

Yumuşak Çekirdekli: 150-250 cc/da (Çiçeklenme dönem başlangıcından ilk meyve oluşum dönemine kadar)

Sert Çekirdekli: 150-250 cc/da (ilk çiçeklenme başlangıcından, meyve oluşum dönemine kadar 15-20 gün ara ile 3-5 uygulama)

Şeker Pancarı: 150-250 cc/da (4-6 yapraklı döneminde)

Çilek: 150-200 cc/da (ilk çiçeklenme başlangıcından, meyve oluşum dönemine kadar)

Bağ: 200 cc/da (Çiçek salkımı oluştuğunda ve meyveler görülmeye başladığında 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama)

Pamuk: Çiçeklenmeden önce koza oluşumunda iki uygulama: 200-250 cc/da

Hububat : (Arpa,BuğdayYulaf vs.) 200-250 cc/da (Kardeşlenme veya sapa kalkma döneminde)

Soğan: 200 cc/da (Yeterli yaprak düzeyi oluştuğunda)

Ayçiçeği: 200-250 cc/da (Bitki boyu 10-15 cm ulaşınca)

Zeytin: 200-250 cc/da (Çiçek önü, meyve büyüme başlangıcında)

Narenciye: 200-250 cc/da (çiçek önü, meyve büyüme dönemine kadar)

Patates: 250-300 cc/da (Bitki çıkışını tamamlamasından yumru gelişimi dönemine kadar)

Kesme Çiçek: 150-200 cc/da (ilk tomurcuklanma döneminde) Damla sulama uygulamalarında : 300-500 gr/da

Muz: Onarım döneminde, ilk uygulama, takibinde 7-10 gün ara ile 2-4 uygulama

Toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

İmalatçı

Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım, Antalya Bulvarı No:15 07190 Döşemealtı/ANTALYA Tel 0242 344 8388 Fax 0242

E-Mail : Makrotarim@makrotarim.com.tr Web: www.makrotarim.com.tr

Ağırlık

0,25-0,5-1-2-5-10-15-17,6 - 20 lt

0,355-0,71-1,42-2,84-7,1-14,2-21,3-25 - 28,4 kg

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / BUGEM

Lisans NO 047, Tescil NO :17663

Dikkat!

Tahriş Edicidir.

İmal/Son Kullanma Tarihi

Barkod

Güvenlik İşareti



Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksi halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Antalya Org.San Böl 1 Kısım Antalya Bulv No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax 0 242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili