

EC FERTILIZER

NPK Gübresi Harmanlanmış Poly Plant 10- 10- 40 + TE

Garanti Edilen İçerik

	% w/w
Toplam Azot (N)	10,00
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	10,00
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	10,00
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	10,00
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	40,00
Suda Çözünür Bor (B)	0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,005
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,01

KLOR İÇERİĞİ: % 0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 +90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER :

Bu ürün Granül yapıda suda tamamen ve hızla çözünen harmanlanmış NPK gübresidir. Bitkilerde bitki besin elementleri noksanlığı olduğu durumlarda yapılacak uygulama ya da uygulamalarda içeriğinde yer alan besin maddesi eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Çocuklardan, evcil hayvanlardan, yiyecek ve içeceklerden uzak tutulması, göz ve vücuda teması halinde bol su ve sabun ile yıkanması gerekmektedir. Serin ve kuru bir yerde iyi muhafazalı bir şekilde saklanmalıdır.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI :

Tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğü şekilde yapraktan püskürtülerek yada damlama sulama sisteminden uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı, sıcak havalarda yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.

makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel:0242 344 83 88 344 07 83 344 04 89
Antalya Kurumlar V.D/ 611 007 05 84
Haydar Ali KARAKOÇ
Firma Temsilcisi

KARIŞABİLİRLİK:

Bu ürün aşırı bazik ve asidik reaksiyonlu, yağ bazlı yüksek sülfür ve bakır içeren ürünler hariç diğer bir çok zirai ilaç ve gübre ile karıştırılarak kullanılabilse de geniş alan uygulamalarında ve tereddüt halinde mutlaka ön test yapılması tavsiye edilir.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI :

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı : (+5°C ile +40°C). Nem ile temas ettirilmemelidir. Ambalaj açık bırakılmamalı, açık kalması halinde kekleşme olabilir. Bu durumun ürünün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

- * Yaprak uygulamaları sırasında zerrelere tenneffüs etmeyiniz.
- * Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- * Yaprak uygulaması sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz, hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz.
- * Maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
- * Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- * Günün en yüksek sıcaklıktaki saatinde uygulamadan kaçınınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



UYARILAR

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz temasından kaçınılmalı, teması durumunda bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ürünü serin ve kuru bir yerde iyi muhafaza edilmiş bir şekilde saklayınız. Direk güneş ışığı altında tutmayınız. Ürünün tenneffüsü durumunda beklenmedik bir etki görülür ise doktora başvurunuz. El ile taşırken dik tutunuz, sallamayınız. Yiyecek, içecek ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

FİRMA BEYANI :

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması durumunda, hatalı depolama ve kullanımından doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

UYGULAMA ŞEKLİ (Doz – Sayısı – Zamanı)

Damla sulama sistemlerinden bitkinin büyüme ve meyve verme dönemlerinde 7 – 8 defa 1 - 2,5 kg dekar / gün dozunda uygulanır. Yapraktan uygulamalarda yukarıda belirtilen gelişim döneminde 15 – 20 gün ara ile 2 – 3 defa olmak üzere 200 -300 gr / da uygulanır. Tarla bitkilerinde (HUBUBAT, ÇELTİK, AY ÇİÇEĞİ, ŞEKER PANCARI VS.) dekara 200 – 350 gr (asgari 20 lt da/su) yapraktan uygulanır . Meyve ağaçları ve sebzelerde 100 lt suya 200-300 gr / da yapraktan pülverize edilir.

Ağırlık : 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg. 50 kg

Bakanlık Lisans No: 047

Bakanlık Tescil No: 24796

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

