

EC FERTILIZER  
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ  
**Topping Green**

**16-0-5 + 6 MgO + ME**

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK:                         | (%) w/w |
|------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                | 16      |
| Nitrat Azotu (N)                               | 1,5     |
| Amonyum Azotu (N)                              | 1       |
| Üre Azotu (N)                                  | 13,5    |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | 5       |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)             | 6       |
| Suda Çözünür Bor (B)                           | 0,75    |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)                       | 4       |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)                        | 4       |

**Klor içeriği: %0,47**

**ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI**

Topping Green; tüm sulama sistemlerinden (salma-damlama-spring-dökme vs) topraktan uygulanabileceği gibi gerek görüldüğünde yaprakтан püskürtülerek de uygulama yapılabilir. Rüzgarlı, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce ürün etiketini okuyunuz. Önerilen dozları asmayınız.

**TEKNİK BİLGİLER**

Topping Green; % 16 Azot (N), % 5 Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O), % 6 Magnezyum Oksit (MgO), % 4 Mangan (Mn), % 4 Çinko (Zn) ve % 0,75 Bor (B) içeren harmanlanmış NK gübresidir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama ve/veya uygulamalar ile i bu element noksanlıklarının giderilmesine de olumlu katkı verir.

**UYARILAR**

- Çocuklardan, Gıdalardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz. •Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
  - Yutmayınız ve Zerreleri tenefüs etmeyiniz. •**Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları asılmamalıdır.** •Uygulamalar sabah erken ve akşam üzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çimli ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız. •Bos ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
  - Uygulamadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz. •Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. •Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilir; İçeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik ürünler ile **KARIŞTIRILMAMALI**, geniş alan uygulamalarında ve tereddüt halinde ön test yapılması önerilir.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

**KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI**

- Yaprak uygulama sırasında zerreleri tenefüs etmeyiniz. Bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz. Hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Rüzgarlı, çimli, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapayınız. Uygulama sabah ve akşam üzere yapılmalıdır.
- Maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
- Bos ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- Günün en yüksek sıcaklıklarındaki saatlerde uygulamadan kaçınız.

**UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI**

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır Depolama sıcaklığı: 5 ila 40 derece arasında olmalıdır. Ürünü aşırı sıcaktan ve nem ile temasdan koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız. Ürünün hava ile temasından veya ambalajın açık kalması durumunda kekleşme olabilir. Bu durumun ürün kalitesi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.



**makro tarım**  
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.  
Antalya Org.San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No 15  
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0242 334 04 89 ANTALYA  
Durmuş DEMİREL  
Sirket Vekili



## FİRMA BEYANI

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bilesim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur. Gübreleme esnasında Koruma ve uyarılara mutlaka uyunuz.

## KULLANIMI-DOZU VE ZAMANI

| Bitki Adı                                                                                                | Uygulama Dönemleri                                                                                                                | Yapraktan Uygulama Dozu                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Meyveler (Armut, Ayva, Badem, Elma, Erik, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Vişne... vb)                           | Çiçeklenme hemen sonra, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve büyüme başlangıcında                                   | 1,5 - 2,0 kg/1 000 Litre suya                              |
| Tarla Bitkileri (Ayçiçeği, Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Pamuk, Nohut, Soya, Şekerpancarı, Tütün, Yulaf) | Hububat türlerinde kardeşlenme döneminde diğer bitkilerde çiçeklenme öncesi ve meyve bağlama dönemlerinde 2-3 uygulama            | 150 - 200 gr/da                                            |
| Bahçe Bitkileri (Bezelye, Fasulye, Havuç, Patates, Pırasa, Sarımsak, Soğan, Ispanak,                     | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3-4 uygulama                                                       | 150 - 200 gr/da                                            |
| Sebzeler (Tarla) Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patlıcan                            | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde 2-4 uygulama önerilir.                                               | 150 - 200 gr/da                                            |
| Sebzeler (Sera) Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patlıcan                             | Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu; meyve büyüme dönemlerinde 3-5 uygulama önerilir.                                               | 125 - 200 gr/100 Litre suya                                |
| Narenciye (Greyfurt Limon Mandalina, Nektarin Portakal)                                                  | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 3-4 cm çaplı olduğunda    | 1,5 - 2,0 kg/1000 Litre suya                               |
| Yeşillik (Marul (Tarla), Marul (Sera), Maydanoz                                                          | Şaşırtmadan 8-12 gün sonra başlanarak 10-15 gün aralar ile 2-3 uygulama                                                           | 125 - 150 gr/100 Litre suya                                |
| Kesme Çiçek (Karanfil, Gül... vb)                                                                        | Ekimden 15-20 gün sonra başlamak üzere 10-15 gün aralar ile 2-3 uygulama                                                          | 100 - 150 gr/100 Litre suya                                |
| Zeytin                                                                                                   | Tomurcuk oluşum (çiçeklenme öncesi) ve meyve renk değişimi sırasında ve gerekliyse hasattan sonra                                 | 1,5-2,0 kg/1000 Litre suya                                 |
| Bağ                                                                                                      | Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama ve meyve büyüme dönemlerinde                                                                     | 1,5-2,0 kg/1000 Litre suya                                 |
| Ceviz                                                                                                    | Meyve bağlama ve meyve büyüme dönemlerinde                                                                                        | 150 - 200 gr/100 Litre suya veya 1 ton suya 2,0 kg         |
| Fındık                                                                                                   | Bıyık atma, meyve bağlama dönemi sonrası uygulama                                                                                 | 150 - 200 gr/100 Litre suya                                |
| Kestane                                                                                                  | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde                                                          | 150 - 200 gr/100 Litre suya                                |
| Kivi                                                                                                     | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi<br>-Taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda | 150 - 200 gr/100 Litre suya<br>200-250 gr / 100 Litre suya |

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
ONAYLANMIŞTIR  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD ŞTİ.  
Antalya Org. San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No 15  
Tel: 0242 334 07 03 / 0242 334 04 89 ANTALYA  
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

DURMUŞ DEMİREL  
Şirket Vekili

|               |                                                                                                                     |                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kolza         | Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama                                                      | 150 - 200 gr/100 Litre suya   |
| Mercimek      | Ekimden 20-25 gün sonra başlanarak 10-15 gün arayla 2-3 uygulama                                                    | 150 - 200 gr/da               |
| Mısır         | Bitki boyu 25-30 cm olunca                                                                                          | 200 -250 gr/da                |
| Muz           | Doğumdan önce ve meyveli dönem başlangıcında 2-3 uygulama                                                           | 150 - 200 gr/100 Litre suya   |
| Nar           | Çiçeklenmeden sonra, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde Meyveler 4-6 cm çaplı olduğunda            | 150 - 200 gr / 100 Litre suya |
| Yerfıstığı    | Ekimden 20-25 gün sonra, 10-15 gün arayla 2-3 uygulama                                                              | 150 - 200 gr/da               |
| Antep Fıstığı | Çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu başlangıcında ve meyve büyüme dönemlerinde 2-4 uygulama | 1,5-2,0 kg/ 1 000 Litre suya  |

**Diğer ürünler;**

Yapraktan (ihtiyaca göre);: 150-200 gr/100 Litre suya

Genel topraktan uygulamalarda: Damlamadan: 400-600 gr/da

Salma Sulamada:600-750 gr/da

Yağmurlama ve spring ile sulama: 200-250 gr/da (Yeteri miktar su ile)

**Net Ağırlık** \_\_\_\_\_ :

**İMALATÇI**

**MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 + 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

T.C.Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı / BUGEM Lisans NO: 047, Tescil NO : xxxxx, Parti NO: xxxxx

**İmal / Son Kullanma Tarihi**

**Güvenlik İşaretleri**

**Barkod**

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksi halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



**makro tarım**  
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.  
Antalya Org.San Böl 1 Kısım Antalya Bulv No 15  
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTALYA  
Antalya Kurumlar V.D. 811 007 0584

*(Signature)*

**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili