

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

VARİOO LEGEND

5,5-0-30+(2CaO)+(2MgO)+(17,5SO₃)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%
Toplam Azot	5,5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	3,0
Üre Azotu (NH ₂ -N)	2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30,0
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	2,0
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	2,0
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	17,5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	1,0
Suda Çözünür Çinko (Zn)	3,0

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 + 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr



TEKNİK BİLGİLER:

Suda tamamen(%100) çözünen; %5,5 Azot(N), %30,0 Potasyum Oksit (K₂O), %2,0 Kalsiyum Oksit (CaO), %2,0 Magnezyum Oksit, %1,0 Mangan(Mn) ve %3,0 Çinko(Zn) ve %17,5 Kükürt trioksit (SO₃) içeren Harmanlanmış NK gübresidir. Bitkilerde bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile bitkilerde özellikle meyvelerde verim ve kalite artışının yanında renk ve aroma üzerine olumlu katkı sağlar. Buğdayda protein oranının artmasına ve şeker pancarında şeker artışı üzerine olumlu etki yapar.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

Tüm sulama sistemlerinden (salma-damlama-spring-dökme vs) topraktan uygulanabileceği gibi, gerek görüldüğünde yaprakтан püskürtülerek de uygulama yapılabilir. Rüzgarlı, çiğli, sıcak havalarda ve don riski olan dönemlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini okuyunuz. Uygulama esnasında koruyucu ekipman kullanınız, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Önerilen uygulama dozlarını aşmayınız.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: 5 ile 35 derece arasında olmalıdır. Ürünü donmaktan koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız

FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden faktörler olsa da (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) İmalatçı, bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No:15 P.K:07190 Döşemealtı / ANTALYA
Tel:0242 344 04 89 - 0242 344 83 88 - 0242 344 04 89
Kuruluş Yılı: V.D. 611 00 05 84

UYARILAR:

- Yalnız.
- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
02.05.21

KARIŞABİLİRLİK:

Diğer bitki besleme ürünleri ve Ziraî Mücadele ilaçları ile karışabilir de ancak Bakırlı, Fosforlu, Yağ içeren ve İçeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik ve Bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında mutlaka ön test yapılmalıdır. Tereddüt halinde Makro Tarım teknik departmanı ile temasa geçiniz.

KULLANILDIĞI BİTKİLER: Örtü altı bitkileri (Domates, Hıyar, Patlıcan, Kabak vs.), Açık tarla sebzeciliği, Yumuşak ve Sert çekirdekli meyve ağaçları, Pamuk, Hububat, Çeltik, Şeker pancarı, Mercimek, Çilek, Ayçiçeği, Bağ, Mısır, Patates, Soğan, Narenciye, Zeytin, Fındık, Antep Fıstığı, Yer Fıstığı, Avokado, Kivi , Kesme çiçekçilik, Havuç, Muz, Kışlık ve Yazlık sebzeler.

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

Antep Fıstığı, Fındık: ilk meyve oluşumunda ve iç doldurma dönemi başlangıcında olmak üzere, dekara 150-200 gr dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Sebzeler: (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Fasülye, Çilek, Kavun, Karpuz vs)

Yapraktan Uygulama: İlk meyve teşekkülünden hasat sonuna kadar 10-15 gün aralar ile 125-150 gr/100 litre suya

Toprakta Uygulama: Meyvelerde ilk renk oluşumunu takiben, hasat sonuna kadar 7-10 gün aralar ile 2-3 kg/da

Tarla Bitkileri: Dane oluşumu ve ağırlığını teşvik, Yağlı bitkilerde yağ oranına etki için dekara 150-200 gr gelecek şekilde üretim periyodu boyunca 8-10 gün aralıklar ile 2-3 uygulama önerilir.

Çilek: Meyve kalitesi ve rengi, raf ve nakliye dayanımı için 125-150 gr/dekar dozunda, meyveli dönem başlangıcından hasat sonuna kadar 4-6 uygulama.

Pamuk: Ürün ve elyaf kalitesi için 150-200 gr/dekar dozunda 2-3 uygulama.

Şeker Pancarı: 8-10 yapraklı döneminden, hasada kadar 10-15 gün aralar ile 2-3 uygulama

Yapraktan: 100-125 gr/da yağmurlama(spring) sulamadan Dekara 100-150 gr dozunda önerilir.

Meyvecilik Meyvelerde irilik, renk, aroma ve depo nakliye dayanımını artırmak için, taş çekirdekli meyvelerde çağa döneminden başlanarak, diğer meyvelerde ilk renk düşümünü takiben 7-10 gün aralar ile 1 ton suya 1.5-1.7 kg dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Bağ: Meyvelerde renk, irilik, aroma artışına yardımcı olmak için, bir ton suya 1.0-1.5 Kg dozunda, ilk meyve oluşumundan hasada kadar 10-15 gün aralar ile 2-4 uygulama.

Zeytin: Meyvelerde homojen renk, irilik ve yağ oranının artışı için, bir ton suya 1.5-2.0 Kg dozunda ilk meyve oluşumunda birinci, renk düşüm döneminde ikinci, hasat başlangıcında üçüncü uygulama önerilir.

Narenciye: Haziranda boncuk döneminde ve renklenme başlangıcında olmak üzere dekara 125-175 gr dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Muz: İlk meyve oluşumundan, meyvelerin standart büyüklüğüne ulaşıncaya kadar. Yapraktan dekara 125-150 gr dozunda 2-4 uygulama Topraktan (Damla Sulama): 2-3 kg/da

Diğer Ürünler: 100 litre suya 50-100 gr dozunda yapraktan, 1,5-2,5 Kg dozunda ise topraktan uygulama önerilir.

NET AĞIRLIK: 250 Gr, 500 Gr, 1 Kg, 2.5 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg.

Lisans No: 047

Tescil No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.