

EC FERTİLİZER
Bor(B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat)
Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Way-outmix LS



02.07.19

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (%)	w/w
Suda Çözünür Bor(B)	0.6
Suda Çözünür Bakır (Cu).....	0.65
Lignosülfonik asit (LS) ile Kompleksli Bakır (Cu).....	0.5
Suda Çözünür Demir (Fe).....	5.
Lignosülfonik asit (LS) ile Kompleksli Demir (Fe).....	4.5
Suda Çözünür Mangan (Mn).....	3
Lignosülfonik asit (LS) ile Kompleksli Mangan (Mn).....	2.5
Suda Çözünür Molibden (Mo).....	0.09
Suda Çözünür Çinko (Zn).....	3
Lignosülfonik asit (LS) ile Kompleksli Çinko(Zn).....	2.5
Klor (Cl) içeriği.....	2.7
Lignosülfonik asit(LS) kompleksinin stabil olduğu pH aralığı.....	4.0-9.0

FORMÜLASYON: KATI - SUDA ÇÖZÜNÜR, MİKRO GRANÜLLER.

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

ÜRÜN HAKKINDA:

Way-outmix LS, mikro granül yapıda, Bor(B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden ve Çinko (Zn) içeren, suda tamamen çözünen, katı halde Mikro bitki besin maddeleri karışımıdır. Bitkilerde mikro bitki besin elementlerinin yetersiz olduğu durumlar da yapılacak uygulama veya uygulamalar ile bu elementlerin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

ÜRÜNÜN DOĞRU ve VERİMLİ KULLANIMI:

Tüm püskürtme(spreyleme) sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğünde bu uygulama hem yapraktan hem topraktan yapılabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalı, rüzgârlı-nemli(çiğli)-günün sıcak saatlerinde ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapılmamalı, uygulamadan önce etiket dikkatlice okunmalıdır. Ürün çoklu karışımlar ile beraber kullanılacak ise, karışımdan önce ön test yapılması tavsiye edilir. Tereddüt halinde **makro tarım ltd.şti.** Teknik departmanı ile iletişime geçiniz.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama koşullarında (+5 C ve 35 C) fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretim tarihinden itibaren 3 yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Ürün nemle temas ettirilmemeli, teması durumundakekleşme olabilir. Bu durumun ürünün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

FİRMA BEYANI:

Etiketdeki bilgi ve uyarılar, araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği, toprak yapısı vs) şirketimiz içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve hatalı kullanımdan doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur.

makro tarım

Ş.Ş. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
Antalya Org.San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 67 83 Fax: 0242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumları D: 611 007 0584

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

UYARILAR:

- *Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- *Uygulama esnasında hiçbir şey yenilmemeli, sigara içilmemelidir. Ürünü yutmayınız, zerrelere teneffüs etmeyiniz. Koriyucu elbise kullanınız.
- *Göz ve cilde teması durumunda bolca temiz su ile yıkanmalıdır.
- *Uygulamalar sabah erken çiğ yokken veya akşamüzeri yapılmalıdır.
- *Uygulama yapmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz. Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Ürün nemle temas ettirilmemeli, varsa kalan kısmı için ambalaj sıkıca kapatılmalıdır.
- *Tavsiye edilen dozlarda suda tamamen çözünür, hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz. Zirai mücadele ilaçları ve yaprak gübreleri ile karışabilir geniş alan uygulamalarında ve içeriği bilinmeyen ürünler ile karıştırmadan önce ön test yapılması tavsiye edilir
- *Yaprak ve Toprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



UYGULAMA ÖNERİLERİ:

Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak vs):

Yapraktan: Aktif gelişme döneminde, 10-15 gün aralar ile 4-6 uygulama önerilir. 40-75 gr/da(veya 100 L suya).

Topraktan: 1 ton sulama suyuna 100-250 gr gelecek şekilde, 10-15 günlük aralar ile 4-6 uygulama.

Kavun-Karpuz: Aktif gelişme döneminde 50-70 gr/da dozunda 1-3 uygulama.

Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kaysı, Kiraz, Vişne, Fındık vs):

Yapraktan: 1 ton suya 500-800 gr gelecek şekilde, Çiçeklenmeden sonra I.uygulama, I.uygulamadan 15-20 gün sonra II. Uygulama önerilir. **Topraktan:** Ağacın yaşına göre değişmekle birlikte, 30-200 gr/ağaç başına düşecek şekilde su ile uygulanır.

Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina vs):

Yapraktan: 1 ton suya 400-800 gr. gelecek şekilde, Çiçeklenme öncesi, Çiçeklenmeden sonra ve yaz sürümün de olmak üzere 3 uygulama önerilir. **Topraktan:** Ağacın yaşına ve noksanlığın şiddetine göre, 30 gr'dan 250 gr'a kadar değişen dozlarda sulama suyu ile verilir.

Zeytin: Yapraktan, Çiçeklenme öncesi ve sonrası, 600-800 gr/1 ton suya gelecek dozda, 2 uygulama.

Hububat (Buğday, Arpa vs), Çeltik, Mercimek, Nohut vs: Yapraktan, 60-80 gr/da dozunda kardeşlenme döneminde veya bitkinin aktif büyüme dönemlerinde tek uygulama önerilir. Noksanlık belirtileri devam ediyor ise 15-20 gün sonra aynı dozda uygulama tekrarlanır.

Patates, Soğan, Havuç, Sarımsak, Yerkıstığı vs: Yapraktan, Bitkilerin aktif gelişme dönemlerinde ve noksanlık belirtilerine göre 40-60 gr/da dozunda 1-3 uygulama.

Pamuk: Yapraktan, 60-90 gr/da. Dozunda, tarak öncesi ve taraklanmadan sonra veya ihtiyaca göre 2-3 uygulama önerilir.

Mısır, Ayçiçeği: Yapraktan, 70-90 gr/da. dozunda bitki boyu 20-40 cm. iken tek uygulama. Noksanlık belirtileri devam ediyor ise 20-25 gün sonra 2.uygulama önerilir.

Şekerpancarı: Yapraktan, 50-75 gr/da. Dozunda, altı yapraklı dönemden sonra 20-25 gün aralar ile 2-3 uygulama.

Çilek: Yapraktan, Dinlenme(uyku) döneminde, Çiçeklenme sonrası ve aktif büyüme dönemlerinde olmak üzere, 40-75 gr/da(veya 100 L suya) dozunda 3-5 uygulama. **Topraktan,** 50-250 gr/da dozunda diğer gübreler ile beraber veya tek olarak sulama suyuna enjekte edilir. İhtiyaca göre uygulama 3-5 kez tekrarlanır.

Bağ: Yapraktan, ilkbaharda sürgün oluşumunda veya noksanlık belirtilerine göre, 60-80 gr/da(veya 1ton suya 600-800 gr) dozunda 15-20 günlük periyotlar 2-4 uygulama.

Kesme Çiçek (Karanfil vs.): Yapraktan, Fide-Fidan dikiminden 15-20 sonra başlanarak 10-15 günlük aralar ile, 40-60 gr/da(veya 100 L suya) dozunda, 2-3 uygulama önerilir. **Topraktan,** 1 ton sulama suyuna 100-200 gr gelecek şekilde, üretim periyodu başlangıcından, hasat sonuna kadar 3-5 uygulama.

Muz: **Topraktan,** Onarım döneminde ve ihtiyaca göre 25-50 gr/bitki dozunda 3-5 uygulama. **Yapraktan,** Aktif gelişme döneminde ve noksanlık belirtilerine göre 60-80 gr/100 L suya gelecek dozda 3-5 uygulama.

Nar: Yapraktan, Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden sonra ve meyve büyüme döneminde olmak üzere, 50-80 gr/da. dozunda(veya 100 L suya) 3-4 uygulama önerilir.

Antepfıstığı: Yapraktan, Çiçeklenme sonrası ve meyve oluşum döneminde, 50-70 gr/da dozunda 2-3 uygulama.

Diğer Ürünler: Yapraktan, Noksanlık belirtileri ve noksanlığın şiddetine göre 30-50 gr/100 L suya gelecek şekilde 2-4 uygulama.

Ağırlık: 0,5 Kg, 1 Kg, 2Kg, 2,5 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg.



İmalatçı/Üretici: **MAKRO TARIM İNŞAAT, TAAHHÜT, TURİZM, PAZARLAMA, SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.**

Organize Sanayi Bölgesi, 1.Kısım, Antalya Bulvarı, NO:15 Döşemealtı / ANTALYA

T : 0 242.344 83 88, F : 0 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / BUGEM

Lisans NO: 047, Tescil NO :..... Parti NO:.....

İmal/Son Kullanma Tarihi

Güvenlik İşaretleri

Barkot

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

Antalya Org.San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulv. No 15

Tel. 0242 334 07 83 Fax 0 242 334 04 89 ANTALYA

Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Piyasaya sunacağımız etiket ile ay-
olacağını taahhüt eder aksinin ispa-
halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemler
peşinen kabul ederiz

DEMİREL
Sirket Vekili