

EC FERTILIZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ (ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
ZiPack

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

%

Suda Çözünür Çinko (Zn)

2,00

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



ÜRETİCİ FİRMA


MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 + 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr



TEKNİK BİLGİLER:

Suda tamamen dağılan %2 Çinko (Zn) içeren sıvı halde gübre çözeltisidir. Bitkilerde bitki besin elementinin noksanlığında yapılacak uygulama ve uygulamalarla çinko eksikliklerinin giderilmesine köklenme, çiçeklenme ve meyve tutumuna yardımcı olur.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

Tüm sulama sistemlerinden (salma-damlama-spring-dökme vs) topraktan uygulanabileceği gibi, gerek görüldüğünde yaprakтан püskürtülerek de uygulama yapılabilir. Rüzgarlı, çiğli, sıcak havalar da ve don riski olan dönemlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini okuyunuz. Uygulama esnasında koruyucu ekipman kullanınız, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Önerilen uygulama dozlarını aşmayınız.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:


Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: 5 ° C / + 40 ° C arasında olmalıdır. Ürünü donmaktan koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalağı sıkıca kapatınız.

FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde faktörler olsa da (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) İmalatçı, bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

UYARILAR:

- *Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- *Göz ve deriye teması halinde en az 15 dakika temiz su ile yıkayınız.
- *Yutmayınız ve zerrelere teneffüs etmeyiniz. Yutulduğunda ve zerrelere teneffüs edildiğinde hasar verici olabilir.
- *Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- *Uygulamalar sabah erken ve akşam üzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli, sıcak havalarda ve don riski varsa yaprakтан uygulama yapmayınız.




*Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.

*Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.

*Tavsiye edilen dozlarda suda hızlı çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.

*Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilse de ancak Bakırılı, Kükürtlü, Yağ içeren ve İçeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik ve Bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında mutlaka ön test yapılmalıdır. Tereddüt halinde Makro Tarım teknik departmanı ile temasa geçiniz.



KULLANILDIĞI BİTKİLER: Örtü altı bitkileri (Domates, Hıyar, Patlıcan, Kabak vs.), Açık tarla sebzeciliği, Yumuşak ve Sert çekirdekli meyve ağaçları, Pamuk, Hububat, Çeltik, Şeker pancarı, Mercimek, Çilek, Ayçiçeği, Bağ, Mısır, Patates, Soğan, Narenciye, Zeytin, Fındık Antep Fıstığı, Yer Fıstığı, Avokado, Kivi , Kesme çiçekçilik, Havuç, Muz, Kışlık ve Yazlık sebzeler.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Örtü Altı Sebzelerinde: 100 litre suya 150-200 cc (150 cc/da)

Açık Tarla Sebzeler: 150-250 cc/da (Çiçeklenme dönem başlangıcında) ve ihtiyaca göre 2-3 uygulama

Yumuşak Çekirdekli: 150-250 cc/da (Çiçeklenme dönem başlangıcından ilk meyve oluşum dönemine kadar.)

Sert Çekirdekli: 150-250 cc/da (İlk çiçeklenme dönem başlangıcından meyve oluşum dönemine kadar 15-20 gün ara ile 3-5 uygulama önerilir.)

Şeker Pancarı: 150-250 cc/da (4-6 yapraklı döneminde) ve üretim periyodunda ihtiyaca göre 2-3 uygulama

Çilek: 150-200 cc/da (İlk çiçeklenme başlangıcından meyve oluşum dönemine kadar)

Bağ: 200 cc/da (Çiçek salkımı oluştuğunda ve meyveler görülmeye başladığında 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir.)

Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşumunda iki uygulama: 200-250 cc/da .

Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mercimek vs.): 200-250 cc/da (Kardeşlenme veya sapa kalkma döneminde).

Soğan, Havuç, Turp vs.:200 cc/da (Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda) ve ilk meyve teşekkülünde

Ayçiçeği: 200-250 cc/da (Bitki boyu 10-15 cm'e ulaştınca)

Zeytin, Fındık, Antep Fıstığı, Avokado, Kivi vs.: 200-250 cc/da (Çiçek önü, meyve büyüme başlangıcında)

Narenciye: 200-250 cc/da (Çiçek önü, meyve büyüme başlangıcında)

Patates: 250-300 cc/da (Bitki çıkışını tamamlamasından yumru gelişimi dönemine kadar) 2-3 uygulama önerilir.

Kesme Çiçekçilik: 150-200 cc/da (ilk tomurcuklanma döneminde) Damlama sulama uygulamalarında: 300-500 gr/da

Muz: Onarım döneminde, ilk uygulama, takibinde 7-10 gün ara ile 2-4 uygulama önerilir.

Toprak'dan Uygulama: 500-1000 cc/ da dozunda (minumum 1000 litre su ile) ihtiyaca göre 2-3 uygulama.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

YOĞUNLUK: 1,50 g/ml

NET AĞIRLIK: 0,75-1,50-7,50-15,0-25,0-30,0 kg

NET HACİM: 0,5-1-5-10-16,67-20 lt

Lisans No: 047

Tescil No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No:

Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

