

EC FERTİLİZER
ZİNCOPHOS
3-25-0 +TE
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : (%) w/w

Toplam Azot: 3
Üre Azotu: 3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): 25
Suda Çözünür Çinko (Zn): 5

Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanılacaktır.
Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız.

TEKNİK BİLGİLER: ZİNCOPHOS; Suda tamamen çözünen %25 Fosfor Penta Oksit, %3 Üre Azotu, %5 Çinko içeren NP gübre çözeltisidir. Bu bitki elementlerinin noksanlığında yapılacak uygulama ve uygulamalarla bu elementlerin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI: ZİNCOPHOS; Tüm püskürtme sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğünde bu uygulama hem yapraktan hem de topraktan yapılabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulama yapmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz. Önerilen dozları aşmayınız.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI: Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: 5 ile 40 °C derece arasında olmalıdır.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI:

- * Yaprak uygulamaları sırasında zerrelere teneffüs etmeyiniz.
- * Yaprak uygulaması sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- * Maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
- * Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- * Günün en yüksek sıcaklıklarındaki saatlerde uygulamadan kaçınınız.

UYARILAR:

- * Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
 - * Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
 - * Yutmayınız ve Zerrelere teneffüs etmeyiniz.
 - * Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
 - * Uygulamalar sabah erken ve akşamüzeri yapılmalıdır.
 - * Rüzgarlı, çiğli, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yapraktan uygulama yapmayınız.
 - * Don riski olan günlerde topraktan uygulama yapmayınız.
 - * Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
 - * Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.
 - * Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.
 - * Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak Bakırlı, Kükürtlü, Yağ içeren ve İçeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik ve Bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında mutlaka ön test yapılmalıdır. Tereddüt halinde Makro Tarım teknik departmanı ile temasa geçiniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Cilt ve göze teması durumunda tahriş edici olabilir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu elbise kullanılmalıdır.

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Antalya Org.San Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Durmuş DE...
Çinko V...

KULLANILDIĞI BİTKİLER: Örtü altı bitkileri (Domates, Hıyar, Patlıcan, Kabak vs.), Açık tarla sebzeciliği, Yumuşak ve Sert çekirdekli meyve ağaçları, Pamuk, Hububat, Şekerpancarı, Çilek, Ayçiçeği, Bağ, Mısır, Patates, Soğan, Narenciye, Zeytin, Süs bitkileri, Kesme çiçek, Havuç, Muz, Kışlık ve Yazlık sebzeler.

UYGULAMA ŞEKLİ: Tüm sulama sistemlerinden (Damlama -yağmurlama-salma -sprinkle sulama) uygulanabilir.

Örtü Altı Sebzelerinde: 100 litre suya 150-200 cc (150 cc/da)

Açık Tarla Sebzeler: 150-250 cc/da (Çiçeklenme dönem başlangıcında)

Yumuşak Çekirdekli: 150-250 cc/da (Çiçeklenme dönem başlangıcından ilk meyve oluşum dönemine kadar.)

Sert Çekirdekli: 150-250 cc/da (İlk çiçeklenme dönem başlangıcından meyve oluşum dönemine kadar 15-20 gün ara ile 3-5 uygulama önerilir.)

Şeker Pancarı: 150-250 cc/da (4-6 yapraklı döneminde)

Çilek: 150-200 cc/da (İlk çiçeklenme başlangıcından meyve oluşum dönemine kadar)

Bağ: 200 cc/da (Çiçek salkımı oluştuğunda ve meyveler görülmeye başladığında 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir.)

Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşumunda iki uygulama: 200-250 cc/da .

Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf): 200-250 cc/da (Kardeşlenme veya sapa kalkma döneminde).

Soğan: 200 cc/da (Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda) .

Ayçiçeği: 200-250 cc/da (Bitki boyu 10-15 cm'e ulaştığında)

Zeytin: 200-250 cc/da (Çiçek önü, meyve büyüme başlangıcında)

Narenciye: 200-250 cc/da (Çiçek önü, meyve büyüme dönemine kadar)

Patates: 250-300 cc/da (Bitki çıkışını tamamlamasından yumru gelişimi dönemine kadar)

Kesme Çiçek: 150-200 cc/da (İlk tomurcuklanma döneminde) Damlama sulama uygulamalarında: 300-500 gr/da

Muz: Onarım döneminde, ilk uygulama, takibinde 7-10 gün ara ile 2-4 uygulama önerilir.

FİRMA BEYANI: Etiketle verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) Şirketimiz bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketleki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

NET AĞIRLIK: Kg

HACİM: Lt



TAHRİŞ EDİCİDİR.

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / BUGEM

Lisans NO:

Tescil NO:

Parti NO:

İMALATÇI : makro tarım İnşaat, Taahhüt, Turizm, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 P.K:07190 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

TEL: 02423340783-3448388

FAX: 02423440489

makrotarim@makrotarim.com.tr

www.makrotarim.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Antalya Org.San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar Ltd. 011 007 0584

Durmuş DEMİREL