

EC FERTILIZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Damlama veya Yağmurlama Sulama Şeklinde Uygulama İçin)

makro Calcium

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>%</u>
Toplam Azot (N)	8,00
Nitrat Azotu	7,10
Amonyum Azotu	0,90
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	13,50

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA


MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 +90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr



TEKNİK BİLGİLER

makro Calcium; Suda tamamen(%100) ve hızlı dağılan, % 8.0 Azot ve % 13.5 Kalsiyum Oksit içeren sıvı Kalsiyum nitrat çözeltisidir. Bitkilerde Azot ve Kalsiyum elementinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile Azot ve Kalsiyum eksikliği giderilmesine yardımcı olur.

ÜRÜNÜN DOĞRU ve VERİMLİ KULLANIMI

makro Calcium; Tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir. Gerekli görüldüğü şekilde yağmurlama ile, yapraktan püskürtülerek ya da damla sulama sisteminden uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı, sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce ürünü iyice çalkalayınız, etiketi okuyunuz.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı : (0 ile 35 °C). Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı bir ürün değildir.

FİRMA BEYANI

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) Şirketimiz bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etikettedeki bilgilerin uygulanmaması halinde, hatalı depolama ve kullanımdan doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

UYARILAR


Çocuklardan, yiyecek, içecek ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınılmalı, teması durumunda bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ürünü serin ve kuru bir yerde iyi muhafaza edilmiş bir şekilde saklayınız. Ürünün tenefüsü durumunda beklenmeyen bir etki görülürse doktora başvurunuz. El ile taşıırken dik tutunuz, sallamayınız. Bazı gübre ve ilaçlar ile kısmen karışabilir de, çoklu karışımlarda içeriği bilinmeyen ürünler ile karışım yapmadan önce mutlaka ön test yapınız. **Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No: 15 07190 Döşemealtı
Tel: 0242 344 07 83 - 344 83 88 - 344 04 89
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 05 84
Firma Temsilcisi


KULLANIM ŞEKLİ

BİTKİLER	UYGULAMA ÖNERİLERİ	DOZ	
		Yağmurlama (cc/da)	Damlamadan (L/da)
Sebzelerin (Domates,Hıyar, Biber, Patlıcan,Bezelye vs.)	Meyveli dönem başlangıcında hasat sonuna kadar 2-6 uygulama	200-250	3-4
Meyve Ağaçları	Meyve bağlama, büyümesi ve hasat öncesine kadar 3-4 uygulama	200-300	3-4
Bağ	Meyve bağlama, büyümesi ve hasat öncesine kadar 3-4 uygulama	250-300	3-4
Narenciye	Meyve tutumu, büyümesi ve hasat öncesine kadar 3-4 uygulama	250-300	3-4
Pamuk	Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama	200-300	1-3
Hububat, Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama	200-300	1-3
Şeker Pancarı, Havuç	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama	200-300	2-3
Patates	Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 1-2 uygulama	200-300	2-3
Kavun, Karpuz	Kol atımından sonra 15 gün ara ile hasat boyu 3-4 uygulama	200-300	2-3
Ayçiçeği	Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 1-2 uygulama	250-350	1-3
Fındık	Çiçek öncesi, bıyık bağlama ve iç bağlama döneminde 3 uygulama	250-350	2-3
Çilek, Ahududu	Çiçek öncesi, sonrası 15 gün ara ile 3-4 uygulama	200-250	1-3
Muz	Oluşum öncesi ve sonrası	200-250	1-3
Mısır	Bitki boyu 30-40 cm olunca ve tepe püskülü çıkardığında 1-2 uygulama	200-250	1-3
Kesme Çiçekçilik	Yapraklanma dönemi ve sonrası 2 uygulama	200-250	1-3
Soğan	Dikimden 30 gün sonra tek uygulama	200-250	2-3

Yukarıdaki öneri dozları tavsiye amaçlı olup, bitki çeşitliliği ve toprak yapısına göre dozlar azaltılıp artırılabilir.



04.11.2020



Yoğunluk (d) 1,39 g/ml

Net ağırlık: 0,3475-0,695-1,39-2,78-6,95-10-13,9-15-20-25-27,8-34,75-41,7-48,65kg

Net hacim: 0,250- 0,500 – 1 –2- 5 -7,20– 10 –10,80- 14,38 –17,99- 20 – 25– 30-35 LT


Bakanlık Lisans No: 047

Bakanlık Tescil No:26462 Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.



04.11.2020

