

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

redPower K

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

%

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

20,00

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



ÜETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA



+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88



+ 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

redPower K : Tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir. Gerekli görüldüğü şekilde yapraktan püskürtülerek yada damla sulama sisteminden uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı, serin havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce ürünü iyice çalkalayınız, etiketi okuyunuz. RedPower K birçok tarımsal kimyasallar ile karışabilse de, geniş alan uygulamalarında mutlaka ön test yapılmalıdır. Tereddüt halinde makro tarım teknik departmanına başvurunuz.

TEKNİK BİLGİLER:

redPowerK : Suda tamamen (%100) ve hızlı çözülen %20 w/w Potasyum Oksit içerir. Bitkilerde bu elementin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile meyve verimi ve kalitesini artırıcı etkiye sahiptir. Çocuklardan, yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalıdır. Gözleri tahriş edebilir. Göz ve deriye temas ettirmeyiniz. Teması durumunda bol su ile yıkanması gerekmektedir. Serin ve kuru bir yerde iyi muhafazalı bir şekilde saklanmalıdır.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:



Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile muhafaza eder: Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: (5 °C ile 40 °C)

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI:

- Yaprak uygulamaları sırasında zerrelere teneffüs etmeyiniz.
- Uygulama sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz.
- Uygulama sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz.
- Maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- Günün en yüksek sıcaklıktaki saatlerinde ve nemli, rüzgarlı, kurak, don riski olan durumlarda uygulamadan kaçınınız.

UYARILAR:

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınılmalı , teması durumunda bolca su ile yıkanmalıdır.
- Ürünü serin ve kuru bir yerde iyi muhafaza edilmiş bir şekilde saklayınız.
- Ürünün teneffüsü durumunda beklenmedik bir etki görülürse doktora başvurunuz.
- Elle taşıırken dik tutunuz, sallamayınız.
- Yiyecek; içecek ve evcil hayvanlardan uzakta tutunuz
- **Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**



FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup; her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da (karışımın hazırlanması uygulama hava koşulları bitki çeşitliliği v.s.) şirketimiz bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması halinde hatalı depolama ve kullanımdan doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER:

Örtü altı bitkileri, Açık tarla sebzeçiliği, Yumuşak ve Sert çekirdekli meyve ağaçları, Havuç, Hububat, Şeker pancarı, Çilek, Ayçiçeği, Bağ, Mısır Patates, Soğan, Narenciye, Zeytin, Süs bitkileri, Kesme çiçek.

KULLANIM DOZ TAVSİYELERİ:

Örtü altı bitkileri (sebzeler): 100 L suya 100 cc (100 cc / da),

Açık Tarla Sebzelerinde: 100-150 cc / da (meyveli dönem başlangıcında)

Yumuşak çekirdekler: 150-200 cc / da (meyveli dönem başlangıcından, ilk hasat dönemine kadar)

Sert çekirdekler: 150-200 cc / da (meyveli dönem başlangıcından 15-20 gün ara ile 3-5 uygulama)

Şeker pancarı: 100-200 cc/da (baş bağlama döneminde)

Çilek: 100-150 cc / da (ilk meyve teşekkülünde)

Bağ: 100 cc / da (Çiçek salkımı oluştuğunda ve meyveler görülmeye başlandığında 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama)

Hububat: (Buğday, Arpa, Yulaf vs.) 100-200 cc / da. (Kardeşleşme veya sapa kalkma döneminde)

Mısır: 200 cc / da (bitki boyu 20-40 cm olunca)

Soğan: 100 cc / da (Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda)

Ayçiçeği: 100-150 cc / da Patates: 150-250 cc / da (Bitki çıkışını tamamlanmasından yumru gelişimi dönemine kadar)

Narenciye: 100-150 cc / da (Meyvelerin büyüme başlangıcında) Zeytin: 150-250 cc / da (Meyveli dönem başlangıcında)

Kesme Çiçekçilik: 100-200 cc / da (ilk tomurcuklanma döneminde) Damla sulama uygulamalarında: 300-500 gr./da

Yukarıdaki öneri dozları tavsiye amaçlı olup, bitki çeşitliliği ve toprak yapısına göre dozlar azaltılıp, artırılabilir.

Yoğunluk (d) 1,50 g/ml

Net ağırlık:0,375-0,75-1,5-3-7,5-15-22,5-25-30-37,5-45-49,5 kg

Net hacim:0,25-0,5-1-2-5-10-15-16,67-20-25-30-33 LT



Bakanlık Lisans No: 047

Bakanlık Tescil No:15209 Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

