

ÇİLEK GÜBRELEME



Cilt sađlığını destekler ve antioksidandır. Sürekli çiçeklenme için Potasyum (K), meyve sertliđi için Kalsiyum (Ca) ve Demir (Fe) ihtiyacı yüksektir.



Web sitesi
www.makrotarim.com.tr



Telefon Numarası
+90 242 344 83 88

ÇİLEK GÜBRELEME PROGRAMI

DÖNEM	TOPRAKTAN 1 da İÇİN (DAMLA/SALMA/SPRING) * YAĞMURLAMASULAMAİÇİN YAPRAKTAN UYGULAMA DOZLARINI BAZ ALINIZ	MİKTAR	kg-L	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 L da SU İÇİN	MİKTAR	g-ml
	TOPRAK HAZIRLIĞI	15.15.15+ Zn + S MAGNEZYUM SÜLFAT MAKSÜLFO 80 SC STRONG K	30 15 3 3	kg kg L kg		
FİDE DÖNEMİ	BLACKLİFE PANCO POLYPLANT 10.40.10 MOL SP23-TOROMOL WINDY ZİBOR	500 500 2 2 500	cc g kg L g	MAK PH SE'LİFE PLUS TRİA QBMZ STYM 25 veya OLA AF 85	125 100 100 200	ml ml g ml
ÇİÇEK OLUŞUMU VE GELİŞME DÖNEMİ	KELLOM FER POLY PLANT 10.40.10 STYM 25 veya OLA AF 85 P.ZİNC veya ZİPPHOS-N MAKROCOMBİ LY-CUPPER GOLD (TEK VERİLECEK)	300 3 2 2 200 1	g kg L L g L	MAGİC FLOWER MAKROCOMBİ STYM 25 veya STYM ANİMAL	150 100 200	g g ml
ÇİÇEK TUTUM VE MEYVE OLUŞUM DÖNEMİ	SE'LİFE PLUS P.ZİNC veya ZİPPHOS-N POLYPLANT 18.18.18 STYM ANİMAL veya STYM 25 TRİA QBMZ	500 2 3 2 500	cc L kg L g	MAK PH ALLİNCA'L 145 WINDY ZİBOR	100 200 200	ml ml g
ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞ	POLYPLANT 18.18.18 STYM 25 veya OLA AF 85 POTAMİNO KST NİTFOSCAL+B LY-CUPPER GOLD (TEK VERİLECEK)	2.5 2 3 1.5 1	kg L kg kg L	MAK PH ALLİNCA'L 145 STYM 25 veya OLA AF 85 GREENBULL	100 200 200 50	ml ml ml ml
MEYVE BAĞLAMA DÖNEMİ	POLYPLANT 16.8.24 STYM 25 veya OLA AF 85 MAKROCOMBİ veya TOROCOMBİ KELLOM FER MAKRO CALCIUM	3 2 200 250 1	kg L g g L	SE'LİFE PLUS AZODOOR ALLİNCAL	200 200 200	ml ml ml
HASAT BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	POLYPLANT 16.8.24 AZODOOR STYM ANİMAL veya STYM 25 POTAMİNO KST LY-CUPPER GOLD (TEK VERİLECEK)	3 3 3 3 1	kg L L kg L	STYM ANİMAL POTAMİNO KST	250 300	ml g
DÖKÜM ARTTIRMA	POLY PLANT 16.8.24 STYM 25 veya OLA AF 85 AZODOOR POTAMİNO KST	3 2 2 2	kg L L kg	SE'LİFE PLUS ALLİNCAL 145 STYM 25 veya OLA AF 85	200 200 200	ml ml ml
RENK VE DOLGUNLUK	KELLOM FER STYM 25 veya STYM ANİMAL POTAMİNO KST	500 2 4	g L kg	AMAROS W POTAMİNO KST ALLİNCAL	150 350 200	g g ml

NOT 1 : Bitkilerde yaprak alımı ve benzeri budama, hasat uygulamalarından sonra üstten koruma amaçlı; 100 L suya 250 ml Cu'Ce uygulaması yapılmalıdır.

NOT 2 : Tuzluluk arz eden topraklarda gübreleme öncesinde, gübrenin hemen önünden Redkey uygulaması yapılmalıdır.

NOT 3 : Yukarıda verilmiş olan gübreleme programı ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup; toprak yapısı ve iklimsel faaliyetle, üretim çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı öneri dozları değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için teknik ekibimize iletişime geçiniz.

NOT 4 : Kök çürüklüklerine karşı 1 da için Ly Cupper Gold 250 ml / da